



Vacuna conjugada contra el neumococo (Prevenar 13) Pneumococcal Conjugate (PCV 13) Vaccine

**Mantenga seguro a su niño.
Vea que reciba todas sus vacunas a tiempo.**

Al recibir sus vacunas a tiempo, su niño puede quedar protegido durante toda la vida contra muchas enfermedades.

Las inmunizaciones han salvado más vidas en Canadá en los últimos 50 años que cualquier otra medida sanitaria.

¿Qué es la vacuna Prevenar 13?

La vacuna Prevenar 13 (o PCV 13) protege contra 13 tipos de la bacteria del neumococo. La vacuna ha sido aprobada por Health Canada (Departamento de Salud de Canadá).

La vacuna Prevenar 13 se administra de manera gratuita como parte de las vacunaciones regulares de su hijo/a. Llame a su proveedor de asistencia sanitaria para concertar una cita.

¿Quién debe recibir la vacuna Prevenar 13?

La vacuna Prevenar 13 se administra a los bebés en una serie de 3 dosis. La primera dosis se administra a los 2 meses de edad, la segunda a los 4 meses y la tercera a los 12 meses. La vacuna se administra al mismo tiempo que otras vacunas infantiles.

Vacuna Prevenar 13	Edad del niño en la vacunación
1ª dosis	2 meses
2ª dosis	4 meses
3ª dosis	12 meses

Se administra una dosis extra de la vacuna a los 6 meses de edad a niños con:

- Ausencia de bazo, o un bazo que no funciona adecuadamente
- Anemia de células falciformes

- Un sistema inmunitario debilitado por una enfermedad o tratamiento médico
- Enfermedad hepática crónica, incluyendo cirrosis, hepatitis B crónica o hepatitis C
- Insuficiencia renal, enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar crónicas
- Trasplante de los islotes pancreáticos o de órganos sólidos, o implante coclear (oído interno), o en espera de uno
- Un trasplante de células madre
- Una enfermedad neurológica crónica que dificulte la eliminación de fluidos de la boca o garganta
- Diabetes, fibrosis quística o fuga crónica de líquido cefalorraquídeo

A los 2 años de edad, un niño con cualquiera de los problemas médicos anteriores también debería recibir una dosis de la vacuna neumocócica polisacárida, que protege contra más tipos de bacterias del neumococo. Para obtener más información, consulte [HealthLinkBC File #62b Vacuna neumocócica polisacárida](#).

Algunas personas de 5 años de edad o más con ciertos problemas médicos corren un riesgo mayor de contraer la enfermedad neumocócica. La vacuna Prevenar 13 se administra de manera gratuita a:

- Niños entre 5 y 18 años de edad con ausencia de bazo, o con un bazo que no funciona adecuadamente
- Adultos y niños de 5 años de edad o más con una infección por VIH o que hayan recibido un trasplante de células madre.

Estas personas también deberían recibir una dosis de la vacuna neumocócica polisacárida después de la última dosis de Prevenar 13. Hable con su proveedor de asistencia sanitaria para recibir información sobre el número de dosis de la vacuna que necesita y sobre cuándo debería recibirlas.

Es importante guardar un registro de todas las vacunas recibidas.

¿Cuáles son los beneficios de la vacuna Prevenar 13?

La vacuna Prevenar 13 es la mejor manera de protegerse contra la enfermedad neumocócica, una enfermedad grave y en ocasiones mortal. Cuando se vacuna, también ayuda a proteger a los demás.

¿Cuáles son las posibles reacciones después de la vacuna Prevenar 13?

Las vacunas son muy seguras. Es mucho más seguro recibir la vacuna que contraer la enfermedad neumocócica.

Entre las reacciones comunes a la vacuna se pueden incluir dolor, enrojecimiento e hinchazón donde se recibió la vacuna. Algunas personas pueden tener fiebre, somnolencia, mal humor, pérdida de apetito, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, vómitos, diarrea o un sarpullido. Estas reacciones son leves y generalmente duran entre 1 y 2 días.

Se puede dar acetaminofén (p. ej. Tylenol®) o ibuprofeno* (p. ej. Advil®) para la fiebre o el dolor. No se debe dar AAS (p. ej. Aspirina®) a ninguna persona menor de 18 años de edad debido al riesgo del síndrome de Reye.

*No se debe dar ibuprofeno a niños menores de 6 meses de edad sin consultar antes a su proveedor de asistencia sanitaria.

Para obtener más información sobre el Síndrome de Reye, consulte el [HealthLinkBC File #84 Síndrome de Reye](#).

Es importante permanecer en la clínica durante 15 minutos después de recibir cualquier vacuna porque existe la posibilidad, extremadamente inusual, menos de 1 en un millón, de tener una reacción alérgica, llamada anafilaxia, que puede poner en peligro la vida. Ésta puede incluir urticaria, dificultad para respirar, o inflamación de la garganta, lengua o labios. Si esta reacción ocurriera, su proveedor de asistencia sanitaria está preparado para tratarla. El tratamiento de emergencia consiste en la administración de epinefrina (adrenalina) y el traslado en ambulancia al servicio de urgencias más cercano. Si desarrolla síntomas después de haber dejado la clínica, llame al **9-1-1** o al número de emergencia local.

Es importante siempre informar acerca de todas las reacciones graves o inesperadas a su proveedor de asistencia sanitaria.

¿Quién no debe recibir la vacuna Prevenar 13?

Hable con su proveedor de asistencia sanitaria si usted o su hijo/a han sufrido una reacción potencialmente mortal a una dosis anterior de la vacuna neumocócica, o a cualquier componente de la vacuna.

No es necesario retrasar la inmunización debido a un resfriado u otra enfermedad leve. Sin embargo, si algo le preocupa, hable con su proveedor de asistencia sanitaria.

¿Qué es una infección neumocócica?

La infección neumocócica está causada por la bacteria *Streptococcus pneumoniae*. La bacteria puede causar infecciones graves y potencialmente mortales como la meningitis, una infección de las membranas que recubren el cerebro, la septicemia, una infección de la sangre, y neumonía, una infección de los pulmones. Entre las complicaciones permanentes de la meningitis se incluyen daños cerebrales y sordera. De cada 4 niños que contraen la meningitis neumocócica, 1 puede morir.

La infección neumocócica se transmite de una persona a otra al toser, estornudar o por un contacto cercano cara a cara. También se puede transmitir por la saliva cuando las personas comparten comida o alimentos. Los bebés y los niños pueden enfermarse al compartir chupones/chupetes, biberones o juguetes usados por otros niños.

La enfermedad neumocócica ahora es poco frecuente entre los niños de B.C. gracias a los programas de inmunización infantil rutinarios.

Consentimiento del menor maduro

Se recomienda que los padres o tutores hablen con sus hijos sobre el consentimiento para la inmunización (vacunación). Los niños menores de 19 años de edad que puedan comprender los beneficios y las posibles reacciones de cada vacuna, así como el riesgo de no inmunizarse, legalmente pueden consentir o rechazar las inmunizaciones. Para obtener más información sobre el consentimiento del menor maduro, visite [HealthLinkBC File #119 La Ley de Infantes, el consentimiento del menor maduro y la inmunización](#).

Para más información

Para obtener más información sobre las inmunizaciones, visite ImmunizeBC en <https://immunizebc.ca/>.



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o visite su unidad local de salud pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que no constituyan una emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito **8-1-1**. El número telefónico de asistencia para personas sordas o con problemas de audición es el **7-1-1**. Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten.